

常微分方程式の数値解法

初期値 $y(0)$ が与えられているとして、初期値問題：

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad x > 0$$

を考える「格子」 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 、「近似解」 $y_n \simeq y(x_n)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) とおく。以下では簡単のため「格子幅」 $x_{n+1} - x_n = h$ は一定とする。

[一段法]

- 陽的 Euler 法 (1 次) : $\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(x_n, y_n).$
- 陰的 Euler 法 (1 次) : $\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(x_{n+1}, y_{n+1}).$
- 台形則 (2 次) : $\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = \frac{f(x_{n+1}, y_{n+1}) + f(x_n, y_n)}{2}.$
- (標準的な 4 次) Runge-Kutta 法 : $\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = \frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{1}{6}k_4.$
ただし, $k_1 = f(x_n, y_n), k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1), k_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2), k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3).$

[多段法] ここでは $f_n = f(x_n, y_n)$ と略記する。

- 中点則 (2 次) : $\frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{h} = f_n.$
- 陽的 Adams 法 :
 - 1 次 : 陽的 Euler 法と一致。
 - 2 次 : $\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = \frac{3}{2}f_n - \frac{1}{2}f_{n-1}.$
 - 3 次 : $\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = \frac{23}{12}f_n - \frac{16}{12}f_{n-1} + \frac{5}{12}f_{n-2}.$
- 陰的 Adams 法 :
 - 1 次 : 陰的 Euler 法と一致。
 - 2 次 : 台形則と一致。
 - 3 次 : $\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = \frac{5}{12}f_{n+1} + \frac{8}{12}f_n - \frac{1}{12}f_{n-1}.$

『数値解析入門 [増補版]』 山本哲郎, サイエンス社より: 中点則の不安定現象




図 10.4 $y' = -2y, y(0) = 1$ に対する中点公式

“Numerical Methods for Ordinary Differential Equations” (Butcher,Wiley) より: 各種公式の安定領域
(それぞれ線の内側が安定)

